Diretrizes DSM para a pigmentação da gema do ovo com CAROPHYLL®

HEALTH • NUTRITION • MATERIALS

CAROPHYLL® - porque cor é importante

A cor da gema é um dos principais critérios utilizados pelo consumidor para julgar a qualidade dos ovos. Dependendo da localização geográfica, da cultura, do marketing e da tradição, existem percepções específicas a respeito da cor. Mas sem dúvida, é verdade que os consumidores da maior parte do mundo preferem gemas de cor amarelado-dourada. Os ovos também são utilizados na fabricação de massas, pães, maionese, etc. e podem conferir uma coloração agradável a esses produtos.

Os carotenoides presentes na ração das galinhas poedeiras são os responsáveis pela cor da gema. A fonte mais importante de carotenoides na ração animal são o milho amarelo (e seus derivados), extratos de tagetes e carotenoides idênticos ao natural como os que se encontram presentes na nossa linha de produtos CAROPHYLL®.

A indústria de ovos e os consumidores preferem gemas bem coloridas, e eles têm razão:

Uma gema bem pigmentada sempre provém de uma galinha saudável.

Fatores que afetam a eficiência da pigmentação da gema

A eficiência dos carotenoides na pigmentação da gema do ovo é determinada por dois fatores principais: a deposição do pigmento na gema do ovo e a cor desse pigmento (o comprimento de onda da cor).

Deposição na gema do ovo

A deposição na gema do ovo do carotenoide oferecido na dieta depende da molécula individual do carotenoide (Fig. 1). À medida em que o teor de carotenoide na ração aumenta, a sua concentração na gema do ovo aumenta na mesma proporção.

Figura 1. Taxa de deposição de vários carotenoides presentes na dieta

Fatores que afetam a eficiência da pigmentação da gema

A cor dos carotenoides

O comprimento de onda de cor dos carotenoides usados na pigmentação da gema do ovo estão na faixa entre 400-600nm do espectro visível de cor. Para o olho humano, esses compostos vão da coloração amarela até o vermelho. A luteína, a zeaxantina e o apo-éster são carotenoides amarelos (comprimento de onda de 445 a 450 nm), enquanto que a cantaxantina é um carotenoide vermelho (comprimento de onda entre 465 e 470 nm).

Figura 2. O comprimento de onda de cor dos vários carotenoides usados na pigmentação da gema do ovo

O princípio da pigmentação da gema do ovo

Existem dois componentes para a pigmentação da gema do ovo. O primeiro (conhecido como fase de saturação) envolve a deposição dos carotenoides amarelos para criar uma base amarela correspondente à faixa aproximada de 7 no DSM Yolk Color Fan (leque de cores da DSM). Essa base amarela é muito importante para uma boa saturação da cor final. Uma vez estabelecida a base amarela, a adição da cantaxantina, que é o carotenoide vermelho (CAROPHYLL® red), muda o matiz da cor para uma coloração mais vermelha-alaranjada – e esse é o segundo componente ou fase de pigmentação. A resposta ao carotenoide vermelho é dependente da dose, e é mais alta do que a resposta aos carotenoides amarelos. Assim, a combinação de carotenoides amarelo e vermelho dá um melhor custo/benefício para a pigmentação da gema do ovo. Na Figura 3 vemos a ilustração desse princípio.

Figura 3. – Fases de pigmentação da gema do ovo

Quanto à eficiência relativa de pigmentação dos carotenoides amarelos, o apo-éster (CAROPHYLL® yellow) é mais eficiente do que a luteína e zeaxantina, que são os principais carotenoides encontrados nas rações. A taxa de deposição muito alta do apo-éster (CAROPHYLL® yellow) faz com que esse seja o carotenoide amarelo mais adequado para a fase de saturação. A Tabela 1 abaixo mostra a eficiência relativa de pigmentação dos carotenoides amarelos (baseada nas taxas de deposição).

Tabla 1. Eficiência relativa de pigmentação dos carotenoides amarelos

Carotenoides amarelos (Fase de saturação)	Eficiência relativa de pigmentação
CAROPHYLL® yellow (Apo-éster)	3
Luteína/Zeaxantina ¹	1

¹ Independente da proporção de luteína e zeaxantina.

Entre em contato

Sedes Regionais

DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte Ltd
 ☎: +65 66 326 500
 ✉: marketing.dnpap@dsm.com

DSM (China) Limited
 ☎: +86 2161 41 8188
 ✉: china.vitamins@dsm.com

DSM Nutritional Products Europe Ltd
 ☎: +41 61 815 7777
 ✉: marketing.dnpe@dsm.com

DSM Nutritional Products América Latina
 ☎: +55 11 3760 6300
 ✉: america-latina.dnp@dsm.com

DSM Nutritional Products, LLC.
 ☎: +1 800 451 8325
 ✉: webshop.dnpna@dsm.com

www.dsm.com/animal-nutrition-health

AVISO
 Embora a DSM tenha tido cuidado diligente para assegurar que a informação contida neste documento seja precisa e atualizada, isso não representa nem dá garantia da sua exatidão, confiabilidade, nem que tal informação seja completa. A informação contida neste documento tem fins informativos e é destinada para ser utilizada somente de forma geral. Esta publicação não constitui nem fornece pareceres científicos ou médicos, diagnóstico ou tratamento e é distribuída sem nenhum tipo de garantia, expressa ou implícita. Em nenhum caso a DSM é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança que o leitor deposite neste material, nem do uso que faça deste. O leitor será o único responsável por qualquer interpretação ou utilização do material aqui contido. O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio. Por favor, contate seu representante local DSM para mais detalhes. Todas as marcas mencionadas neste folheto são marcas registradas ou marcas comerciais da DSM na Holanda e/ou outros países.

© DSM Nutritional Products Ltd 2013

Como utilizar o leque de cor (DSM Yolk Color Fan)?

O leque de cor DSM Yolk Color Fan proporciona um meio simples de medir a cor da gema. No entanto, deve-se prestar atenção aos seguintes fatores durante o procedimento:

- Fazer sempre a avaliação sobre uma superfície branca não-refletiva, para assim eliminar a influência das cores circundantes ou adjacentes.
- Usar luz natural indireta sem luz artificial forte. É importante evitar o reflexo da superfície brilhante da gema do ovo.
- As lâminas do leque devem estar posicionadas imediatamente acima da gema e serem olhadas na vertical, de cima para baixo, com os números das lâminas virados para baixo, posicionando a gema entre as pontas das lâminas. A pessoa que faz a leitura da cor tem que olhar sempre a lâmina do lado sem número, mostrando o número para o assistente, para que seja registrado. Entre um ovo e outro, fechar o leque para garantir neutralidade entre cada mensuração
- A avaliação de qualquer série experimental deve ser feita sempre pelo mesmo observador profissional. As séries devem incluir de 4 a 25 ovos (dependendo da variabilidade) que devem ser avaliados cada um individualmente.
- Ao terminar, limpe o leque e guarde-o longe de fontes diretas de luz.

Como chegar na faixa (escore) de cor indicada no DSM Yolk Color Fan (DSM-YCF) usando CAROPHYLL®?

Primeiro, determine qual a faixa desejada no Yolk Color Fan (DSM-YCF). Se escolher 12/13, a maioria dos ovos ficará entre essas faixas.

Consulte a tabela 3 para calcular a quantidade de xantofila contida nos ingredientes usados na ração. E para terminar, consulte a Tabela 4 para saber quanto de CAROPHYLL® red e CAROPHYLL® yellow é necessário para atingir a faixa DSM-YCF escolhida.

Exemplo: o objetivo é chegar na faixa 13 do DSM-YCF. A ração contém 15% de milho amarelo, 2% de glúten de milho (60%) e 1% DDGS (grãos secos de destilaria). A tabela 3 mostra que o teor de xantofila amarela dessa ração é de 6 ppm.

Tabela 3. Exemplo de cálculo do teor de xantofila na ração

Ingrediente da ração	Teor de xantofila amarela (ppm)*	Taxa de inclusão do Ingrediente (%)	Total de xantofila (ppm)
Milho amarelo	14	15	2.1
Glúten de milho (60%)	180	2	3.6
DDGS	25	1	0.3
Outros ingredientes	0	79	0
Total do teor de xantofila na ração			6.0

* O teor de xantofila dos ingredientes das rações varia dependendo das diferenças dos cultivares, condições de colheita e de armazenamento.

Agora você pode usar a formulação de menor custo ou usar a Tabela 5 para determinar os níveis necessários de CAROPHYLL® yellow e CAROPHYLL® red.

Formulação de menor custo

Exemplo para uma formulação de baixo custo:

Para chegar na faixa 13 do DSM-YCF, são necessários 10,5ppm de carotenoides amarelos (base amarela). Considerando o exemplo da tabela 3, é necessário adicionar 4,5ppm de carotenoides amarelos, em soma aos já contidos na ração (10,5ppm – 6ppm). Quando usamos Apo-éster, dividimos essa quantidade por 3 devido sua alta eficácia de pigmentação(- ver Tabela 1). Portanto, temos que usar 1,5 ppm de Apo-éster (= 15ppm CAROPHYLL® yellow 10%) e 4,0 ppm de cantaxantina (= 40 ppm de CAROPHYLL® red 10%).

Tabela 4. Carotenoides totais necessários para uma formulação de baixo custo

Faixa/Escore DSM-YCF	Carotenoides amarelos = luteína + zeaxantina + 3 x apo-éster (ppm)	Cantaxantina (ppm)
8	75	0,5
9	75	1,0
10	75	1,5
11	75	2,0
12	9	3,0
13	10,5	4,0
14	10,5	5,0
15	10,5	5,5

Níveis^{1,2} recomendados de CAROPHYLL® yellow 10% e CAROPHYLL® red 10% para a pigmentação da gema de acordo com a faixa desejada do leque de cor (DSM yolk color fan)

Tabela 5.

Carotenoides amarelos na ração (ppm)	7/8	8/9	9/10	Faixa do DSM Yolk Color Fan				
				10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
0-2	20-25 ● 5 ●	20-25 ● 5-10 ●	20-25 ● 10-15 ●	20-25 ● 15-20 ●	25-30 ● 25-30 ●	30-35 ● 35-40 ●	30-35 ● 40-50 ●	30-35 ● 50-55 ●
2-4	15-20 ● 5 ●	15-20 ● 5-10 ●	15-20 ● 10-15 ●	15-20 ● 15-20 ●	20-25 ● 25-30 ●	25-30 ● 35-40 ●	25-30 ● 40-50 ●	25-30 ● 50-55 ●
4-6	10-15 ● 5 ●	10-15 ● 5-10 ●	10-15 ● 10-15 ●	10-15 ● 15-20 ●	15-20 ● 25-30 ●	20-25 ● 35-40 ●	20-25 ● 40-50 ●	20-25 ● 50-55 ●
6-8	5-10 ● 5 ●	5-10 ● 5-10 ●	5-10 ● 10-15 ●	5-10 ● 15-20 ●	10-15 ● 25-30 ●	15-20 ● 35-40 ●	15-20 ● 40-50 ●	15-20 ● 50-55 ●
8-10		5 ●	5-10 ●	10-15 ●	15-20 ●	20-25 ●	25-30 ●	30-35 ●
10-15	5 ●	5-10 ●	10-15 ●	15-20 ●	20-25 ●	25-30 ●	30-35 ●	35-40 ●
15+		5 ●	10-15 ●	15-20 ●	20-25 ●	25-30 ●	30-35 ●	35-40 ●

1 = ppm of CAROPHYLL® yellow 10%. 2 = ppm of CAROPHYLL® red 10%. Na base de um consumo diário de ração de 110 g/galinha/dia. Caso o consumo seja menor, aumentar a inclusão de CAROPHYLL® conforme necessário. De maneira a manter a saturação em ovos cozidos, recomenda-se adicionar 20-40 ppm de CAROPHYLL® yellow.

Avaliação do carotenoide total com iCheck® Egg

iCheck® egg é um método rápido e preciso de avaliar o carotenoide total expressos como β-caroteno equivalente na gema. A relação entre a cor e a concentração de carotenoides da gema não é linear. Com altos níveis de inclusão de carotenoide, o uso do leque de cor ou de colorímetros não será eficaz para estimar a concentração do mesmo na gema. Com iCheck® egg temos uma alternativa perfeita ao HPLC. Ele é preciso, portátil, móvel e econômico. Especialmente adequado para ovos integrais líquidos, gemas líquidas de alto colorido e para o ovo em pó integral ou gema em pó.

Entre em contato com o responsável de vendas DSM se quiser conhecer as vantagens e benefícios do dispositivo iCheck® egg.

Productos CAROPHYLL® - pigmentação consistente da gema do ovo

Muitos anos de experiência na química dos carotenoides conferem à DSM uma especialização na fabricação de produtos de excepcional qualidade.

CAROPHYLL® yellow 10% e CAROPHYLL® red 10% são produtos granulados com alta capacidade de mistura. São pequenos grânulos nos quais o carotenoide é finamente distribuído em uma matriz encapsulada de amido vegetal e carboidrato com adição de antioxidantes, tornando CAROPHYLL® um produto isento de origem animal. O processo exclusivo de fabricação, conhecido como "revestimento spray dried",

protege os carotenoides da oxidação, conferindo ao produto alta estabilidade, ótima distribuição e excepcionais propriedades de mistura, além de muito boas características de absorção.

Tabela 2. Especificações do CAROPHYLL® yellow 10% e do CAROPHYLL® red 10%

	CAROPHYLL® yellow 10%	CAROPHYLL® red 10%
Aspecto	Partículas marrom-avermelhado, de alta escoabilidade	Partículas roxo-avermelhado a vermelho-arroxado, de alta escoabilidade
Granulometria (peneiras padrão U.S.)	100% peneira No. 20 Min. 90% pen. No. 40 Max. 20% pen. No. 100	100% peneira No. 20 Min. 90% pen. No. 40 Max. 30% pen. No. 100
Teor mínimo	10% Apo-éster	10% Cantaxantina