



CEVAC CORYMUNE® 7K

Vacina inativada contra a Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa, Síndrome da Queda de Postura, Coriza Infecciosa (sorotipos A, B e C) e *Salmonella* Enteritidis

USO VETERINÁRIO

COMPOSIÇÃO

Contém os vírus da Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa (tipo Massachusetts), Síndrome da Queda de Postura (EDS'76), e as bactérias *Avibacterium paragallinarum* dos sorotipos A, B e C, causadores de Coriza Infecciosa e *Salmonella* Enteritidis, inativados e suspensos em emulsão a óleo.

INDICAÇÃO

É recomendada para galinhas reprodutoras e poedeiras comerciais como auxiliar na prevenção da Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa (tipo Mass), Síndrome da Queda de Postura, Coriza Infecciosa e infecções pela *Salmonella* Enteritidis.

Antes da vacinação com a Cevac Corymune 7k as aves devem:

1. ser previamente imunizadas com vacinas vivas contra a Doença de Newcastle e Bronquite Infecciosa;
2. e também, ao redor de 4-6 semanas antes da vacinação com a Cevac Corymune 7k, ser imunizadas com vacinas inativadas contra Coriza Infecciosa e *Salmonella* Enteritidis.

ADMINISTRAÇÃO E DOSAGEM

Deve ser administrada a aves de pelo menos 8 semanas de idade. A vacinação é recomendada pela via intramuscular (músculo do peito) ou via subcutânea (sob a pele do pescoço) na dose de 0,5 mL por ave.

PRECAUÇÕES

Uma proteção efetiva será obtida somente em aves saudáveis bem desenvolvidas.

Usar somente equipamentos de injeção limpos e desinfetados.

Manter a vacina na temperatura ambiente (25 a 30°C) por 4 a 8 horas antes do uso.

Agitar o frasco antes e durante a aplicação.

Verificar a precisão da seringa para garantir que seja aplicada a dose adequada.

Uma vez aberto o frasco, o conteúdo deve ser usado imediatamente. Caso contrário, o conteúdo deve ser descartado.

Não misturar esta vacina com outras vacinas ou produtos farmacêuticos.

Se a vacina for injetada acidentalmente em um operador, a atenção médica é requerida com urgência.

**CONSERVAÇÃO**

Conservar entre +2°C e +8°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

APRESENTAÇÕES: 500, 1000 doses e 3000 doses.

NÃO CONGELAR.

VALIDADE

02 (dois) anos a partir da data da fabricação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.723/2013 em 04/03/2013.

| Responsável Técnico: Dr. Cassio Renato Murin – CRMV/SP: 6473

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua Dr. Elton César, 121

Chácaras Campo dos Amarais – Campinas/SP

CEP: 13082-025 CNPJ: 03.224.570/0003-15

SAC: 0800 7700335

cevabrazil@ceva.com



MODELO DE RÓTULO-BULA

CEVAC CORYMUNE® 7K

Vacina inativada contra a Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa, Síndrome da Queda de Postura, Coriza Infecciosa (sorotipos A, B e C) e *Salmonella* Enteritidis

USO VETERINÁRIO

250 mL /500 doses
500 mL /1000 doses
1500 mL /3000 doses

COMPOSIÇÃO

Contém os vírus da Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa (tipo Massachusetts), Síndrome da Queda de Postura (EDS'76), e as bactérias *Avibacterium paragallinarum* dos sorotipos A, B e C, causadores de Coriza Infecciosa e *Salmonella* Enteritidis, inativados e suspensos em emulsão a óleo.

INDICAÇÃO

É recomendada para galinhas reprodutoras e poedeiras comerciais como auxiliar na prevenção da Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa (tipo Mass), Síndrome da Queda de Postura, Coriza Infecciosa e infecções pela *Salmonella* Enteritidis.

Antes da vacinação com a Cevac Corymune 7k as aves devem:

1. ser previamente imunizadas com vacinas vivas contra a Doença de Newcastle e Bronquite Infecciosa;
2. e também, ao redor de 4-6 semanas antes da vacinação com a Cevac Corymune 7k, ser imunizadas com vacinas inativadas contra Coriza Infecciosa e *Salmonella* Enteritidis.

ADMINISTRAÇÃO E DOSAGEM

Deve ser administrada a aves de pelo menos 8 semanas de idade. A vacinação é recomendada pela via intramuscular (músculo do peito) ou via subcutânea (sob a pele do pescoço) na dose de 0,5 mL por ave.

PRECAUÇÕES

Uma proteção efetiva será obtida somente em aves saudáveis bem desenvolvidas.

Usar somente equipamentos de injeção limpos e desinfetados.

Manter a vacina na temperatura ambiente (25 a 30°C) por 4 a 8 horas antes do uso.

Agitar o frasco antes e durante a aplicação.

Verificar a precisão da seringa para garantir que seja aplicada a dose adequada.

Uma vez aberto o frasco, o conteúdo deve ser usado imediatamente. Caso contrário, o conteúdo deve ser descartado.

Não misturar esta vacina com outras vacinas ou produtos farmacêuticos.

Se a vacina for injetada acidentalmente em um operador, a atenção médica é requerida com urgência.

**CONSERVAÇÃO**

Conservar entre +2°C e +8°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÃO CONGELAR.**VALIDADE**

02 (dois) anos a partir da data da fabricação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.723/2013 em 04/03/2013.

| Responsável Técnico: Dr. Cassio Renato Murin – CRMV/SP: 6473

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua Dr. Elton César, 121

Chácaras Campo dos Amarais – Campinas/SP

CEP: 13082-025 CNPJ: 03.224.570/0003-15

SAC: 0800 7700335

cevabrazil@ceva.com

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

PART.:

FABR.:

VENC.: