



**VACINA VIVA CONTRA A
ANEMIA INFECCIOSA DAS GALINHAS
Vírus Vivo**

CIRCOMUNE®

USO VETERINÁRIO

COMPOSIÇÃO

CIRCOMUNE contém cepa do vírus da Anemia infecciosa das galinhas $\geq 10^{4,9}$ TCID₅₀ por dose, glicerol e solução de tintura azul. A gentamicina e a anfotericina B são adicionados como agentes bacteriostáticos. O vírus é estável, permitindo que a vacina seja apresentada em forma de solução líquida, pronta para uso.

INDICAÇÃO

CIRCOMUNE é indicada para a prevenção da Anemia infecciosa das galinhas. Deve ser aplicada em galinhas reprodutoras com 9 a 12 semanas de idade.

ADMINISTRAÇÃO E DOSAGEM

AGITE ANTES DE USAR.

Vacina pronta para uso. Remover o selo e a tampa do frasco. Submergir a agulha do aplicador com ponta dupla no frasco da vacina até que as ranhuras da seringa estejam cheias de líquido. Segurar cuidadosamente cada ave a ser vacinada. Aplicar 0,01 mL por ave. Injetar o aplicador na zona da prega da asa, na parte inferior, evitando contato com penas, músculos, ossos e vasos sanguíneos. Submergir o aplicador entre cada vacinação.

PRECAUÇÕES

Após aberto utilizar todo o conteúdo do frasco dentro de 4 horas. Vacinar apenas as aves saudáveis. Não diluir a vacina nem administrar menos de uma dose por ave. Todas as galinhas susceptíveis devem ser vacinadas ao mesmo tempo. Evitar condições de estresse durante e após a vacinação. Quando terminar a vacinação, incinerar este frasco e todo o conteúdo não utilizado. Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não administrar nenhum produto por via oral a uma pessoa inconsciente.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não vacinar aves em postura. Não vacinar aves com menos de 3 semanas de idade, pois podem ocorrer sinais clínicos de anemia. Não vacinar aves com mais de 12 semanas de idade, pois pode resultar em transmissão vertical para a progênie.

PERÍODO DE CARÊNCIA: Não vacinar as aves dentro de 21 (vinte e um) dias antes do abate.



NOTA: Esta vacina tem sido submetida a rígidos testes de potência, segurança e pureza encontrando-se dentro dos padrões de qualidade da BIOMUNE CO. A reação de cada ave à vacinação depende de vários fatores, tais como: estado de saúde e reação individual de cada ave, grau de exposição à doença, bem como, conservação, manuseio e administração correta da vacina.

CONSERVAÇÃO

Conservar entre +2°C e +8°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VALIDADE: 18 (dezoito) meses após a data da fabricação.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 10 mL (1.000 doses) e 20 mL (2.000 doses) acondicionados em embalagem coletiva contendo 10 frascos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob no 9.241 em 17/11/06.

Resp. Técnica: Dra. Sandra Fernandez - CRMV/SP: 9.267.

Representante exclusivo no Brasil, Importador e distribuidor:

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 , Santa Terezinha - Paulínia/SP

CEP: 13.148-115 CNPJ: 03.224.570/0001-53

SAC: 0800 770 0355

cevabrazil@ceva.com

Proprietário e fabricante:

Biomune Co.

8906 Rosehill Rd. Lenexa, KS 66215 - EUA

U.S. Vet Llc. No. 368

PRODUTO IMPORTADO