VECTORMUNE FP-LT

Fórmula:
Cada dose do produto contém:
Suspensão de vírus da bouba aviária geneticamente modificado (vetor), expressando antígenos da laringotraqueíte aviária, com título mínimo na:
Data da liberação.....10^3,2 TCID50
Data do vencimento.....10^2,7 TCID50
Estabilizante q.s.p.....1 dose

Indicações:
A vacina é recomendada para ser utilizada em pintainhos saudáveis com pelo menos 1 semana de idade ou ovos embrionados de galinha de 16 dias seguidos por um reforço com 7 dias de idade como um complemento na prevenção da Bouba Aviária e Laringotraqueíte.

Dosagem:
Preparação da Vacina:
Ler cuidadosamente as instruções antes do uso. As instruções devem ser seguidas completamente. Combinar a dose da vacina com o volume apropriado de diluente e a via de administração como descrito a seguir.

1. Para vacinação na membrana da asa de pintainhos com pelo menos 1 semana de idade. Misturar 10 mL de diluente azul para cada 1.000 doses de vacina, e administrar 0,01 mL por pintainho.

2. Para vacinação in ovo de ovos embrionados de galinha com 18 dias. Misturar 100 mL de diluente vermelho para cada 1.000 doses de vacina, e administrar 0,1 mL por ovo embrionado ou misturar 50 mL para cada 1.000 doses de vacina, e administrar 0,05 mL por ovo embrionado.

Vacinação via Membrana da Asa:
1. Remover o lacre e a tampa do frasco da vacina e diluente. Despeje todo conteúdo do diluente no frasco da vacina, feche a tampa, e misture bem. A vacina está pronta para o uso e deve ser utilizada dentro do período de 2 horas.

2. Segurar cada ave individualmente e estender a asa com o lado inferior para cima. Submergir o aplicador no frasco da vacina até que as ranhuras encham com líquido e administrar 0,01 mL por ave.

3. Injetar o aplicador com ponta-dupla na porção da membrana da asa, evitando contato com vasos sanguíneos, músculos e ossos.

4. Após 7-10 dias da vacinação, observar algumas aves para verificar a presença de

Ceva Saude Animal Ltda
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Santa Teresinha, Paulínia/SP – Brasil
CEP : 13.148-115 Tel: +55 19 3833-7700 – Fax: +55 19 3833- 9910
www.cevabrasil.com.br cevabrasil@ceva.com

reações locais de "pega" da vacina, que incluem aumento de espessura e formação de crosta no local da aplicação.

Vacinação In Ovo:
1. A vacina é administrada in ovo em embriões de galinha com pelo menos 18 dias de incubação. Ler o Manual do equipamento de vacinação in ovo antes do início da vacinação. Erros na observação das instruções podem resultar em injúrias ao operador, excessiva mortalidade dos embriões e/ou baixa eclosão, e baixa eficácia a campo. Inocular cada embrião com uma dose de 0,05 mL ou 0,1 mL.

2. Sanitizar o sistema de inoculação de ovos antes e depois do uso seguindo os procedimentos descritos no manual operacional.

3. O reforço deverá ser administrado na membrana da asa em galinhas com 7 dias de idade como descrito acima.

Administração:
Vacinação via membrana da asa ou in ovo.

Precauções:
1. Ler cuidadosamente as instruções acima.
2. Usar a vacina dentro do período de 2 horas após a rehidratação.
3. Não vacinar 21 dias antes do abate.
4. A vacina contém gentamicina e anfotericina B como conservantes.
5. Incinerar embalagens e o conteúdo não utilizado.
6. Galinhas que receberam esta vacina não devem ter sido previamente vacinadas contra a Bouba Aviária.
7. Utilizar somente o diluente fornecido pelo proprietário desta vacina, visto que todas as provas de controle de qualidade foram realizadas com diluente próprio. Mantenha um registro das vacinas e diluentes utilizados.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Apresentação:
500, 1000, 2000 ou 4000 doses.

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
001/2011

Responsável Técnico:
Dra. Sandra Fernandez - CRMV: SP 9.267